

Richtlijnen voor de inname van geneesmiddelen als U een ingreep of een onderzoek ondergaat

De **algemene regel is dat uw dagelijkse geneesmiddelen best gewoon verder ingenomen worden, ook op de dag van de ingreep of het onderzoek.** U neemt uw geneesmiddelen in op de voorziene uren met kleine beetjes water. Dit geldt ook voor puffs of aerosols die genomen worden voor longziekten. Voor veel medicaties is de inname, ook op de dag van de ingreep immers heel belangrijk. Het plots stoppen van bepaalde geneesmiddelen, zoals geneesmiddelen voor hoge bloeddruk, kan immers ongewenste gevolgen hebben. Voorbeelden van geneesmiddelen die best niet gestopt worden zijn:

Algemene regel: de meeste medicaties worden best niet gestopt

- **B-Blockers (hartziekten en hoge bloeddruk):** Seloken[®], Selozok[®], Isoten[®], Tenormin[®], Kredex[®] en vele andere
- **Anti-anginosa (hartziekten en hoge bloeddruk):** Cedocard[®], Isordil[®], Corvaton[®] en Corvatar[®], Nitroderm[®] pleister, Deponit[®] en andere
- **Anti-hypertensiva (hoge bloeddruk):** medicaties om de bloeddruk te verlagen worden best niet gestopt.
- **Longmedicaties zoals puffs en aerosolen:** Ventolin[®], Duovent[®]
- **Corticosteroiden (cortisone)**
- **Anti-epileptica (medicatie tegen epilepsie) :** Depakine[®], Luminal[®], Diphantoine[®], Lamictal[®] ...
- **Complexe medicaties:** indien u zeer delicate of uitzonderlijke medicaties neemt zoals bijvoorbeeld na transplantatie worden die ook best verder ingenomen, doch overleg met de behandelende arts of anesthesist is noodzakelijk.
- **Insuline voor suikerziekte:** Op de dag van de ingreep wordt een speciaal regime opgesteld. De dag vòòr de ingreep mag U de normale hoeveelheden toedienen, rekening houdend met uw suikerinname.

UITZONDERINGEN op de algemene regel zijn:

Verwittig uw arts indien hieromtrent problemen of vragen zijn

<u>MEDICATIES</u>	<u>VOORBEELDEN</u>
<p>Aspirines en zijn derivaten: Aspirines verminderen de bloedstolling. Afhankelijk van het type ingreep en de reden waarvoor U aspirines moet innemen, wordt beslist door uw huisarts of behandelende arts of ze al dan niet 7 dagen voor de ingreep moeten gestopt worden.</p> <p>N.S.A.I.D.'s: deze producten kunnen de bloedstolling verminderen, weliswaar in mindere mate dan de aspirines. In sommige gevallen kan het aangewezen zijn deze producten 1 tot 3 dagen vòòr de ingreep te stoppen.</p>	<p>- Aspro[®], Dispril[®], Acenterine[®], Asaflo[®], Cardioaspirine[®], e.a.</p> <p>- Brufen[®], Voltaren[®], Brexine[®], Apranax[®], Feldene[®] en vele andere</p> <p>- Paracetamol - preparaten zijn veilig</p>
<p>Ticlid en Plavix: deze producten verminderen de bloedstolling. Ze worden meestal gestopt een 7-tal dagen voor de ingreep, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of toegestaan door uw huisarts of behandelende arts.</p>	<p>- Ticlid[®], Plavix[®]</p>
<p>Bloedverduuners zoals Marcoumar: daar deze producten uw bloed heel sterk verdunnen, moeten ze gestopt worden een 5 tot 7 - tal dagen vòòr de ingreep. Dit gebeurt in samenspraak met uw huisarts en behandelende arts. Via controle bloednames (de "PT") controleren we of het product bij u reeds uitgewerkt is. Veelal wordt tijdelijk een vervangend product toegediend via onderhuidse insputingen (Fraxiparine[®], Clexane[®], Fragmin[®] of Heparine[®]).</p>	<p>- Marcoumar[®], Sintrom[®], Marevan[®]</p>
<p>Orale Anti-diabetica (medicaties voor suikerziekte): deze medicaties worden niet ingenomen op de avond vòòr de ingreep en op de dag van de ingreep</p>	<p>- Diamicon[®], Glurenorm[®], Glucophage[®], Glibenese[®], Daonil[®], Euglucon[®], Minidiab[®] en vele andere</p>
<p>Diuretica: "waterafdrijvende" producten: worden niet ingenomen op de dag van de ingreep</p>	<p>- Fludex[®], Hygroton[®], Lasix[®], Burinex[®], Aldactone[®], Canrenol[®], Spironolactone[®], Diamox[®], Dytenzide[®], Aldactazine[®] en vele andere</p>
<p>ACE-inhibitoren en ARB: het kan zijn dat u een ACE-inhibitor of een Angiotensine-II receptor antagonist inneemt voor de behandeling van hoge bloeddruk. U mag deze producten gewoon verder nemen tot en met de avond vòòr de ingreep, doch ze worden best niet ingenomen op de dag van de ingreep.</p>	<p>- Capoten[®], Inhibace[®], Renitec[®], Fosinil[®], Zestril[®], Captopril[®], Novatec[®], Coversyl[®], Accupril[®], Ramace[®], Tritace[®], Cibacen[®] en andere</p> <p>- Atacand[®], Cozaar[®], Micardis[®], Teveten[®], Loortan[®], Diovane[®], Aprovel[®] en andere</p>