

TOELICHTING BIJ ONDERZOEK ONDERZOEK VAN DE MAAG (GASTROSCOPIE)

Aan patiënt: (naam + voornaam)
(geboortedatum)
(straat + nr)
(postcode + woonplaats)

U wordt verwacht op de dagkliniek voor het verrichten van een onderzoek van de maag onder verdoving op (datum afspraak) om 11u nuchter.

Indien u belet bent of de datum van het onderzoek wil veranderen vragen we u beleefd contact op te nemen met de dienst Endoscopie (051/23.72.03).


Het is wenselijk dat u via de opnamedienst van het ziekenhuis (051/23.70.45) een kamer op het dagziekenhuis vooraf vastlegt en de kamerkeuze gaat ondertekenen na toelichting van eventuele supplementen.

Doel van het onderzoek :

Dit onderzoek laat toe de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm (duodenum) te onderzoeken door middel van een endoscoop : een soepel buisje, dat via de mond wordt ingebracht. Tijdens het onderzoek kunnen biopsies (kleine stukjes van het slijmvlies) worden genomen, voor microscopisch onderzoek. Op die manier kan meer informatie verkregen worden over letsels die gezien worden, of om ontsteking of infecties op te sporen. Tijdens het onderzoek is behandeling mogelijk: een bloeding kan gestopt worden, een vernauwing kan verbreed worden, poliepen kunnen verwijderd worden.

Vorbereiding :

Om in goede omstandigheden te kunnen gebeuren, is het belangrijk dat de maag leeg is voor een gastroscopie. Men mag dus niet eten of drinken binnen de 6 uur voor het onderzoek.



Breng de arts op de hoogte van uw eventuele allergieën, ernstige ziekten (diabetes, hart –of longziekten, stollingsproblemen) en van medicatie die u neemt, zeker wanneer het gaat om bloedverdunnende middelen (Aspirine en pijnstillers met Aspirine in combinatie, Sintrom, Marevan, Marcoumar, Ticlid en Plavix). Sommige geneesmiddelen mag u gewoon verder nemen, maar vraag hiervoor advies aan uw arts. Voor het onderzoek moeten tandprothesen uitgenomen worden, een bril wordt best afgezet.

Verloop van het onderzoek :

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt maximaal een 10-tal minuten, maar kan onaangenaam zijn. De last wordt verminderd door keelverdooving, en eventueel injectie van een kalmeermiddel via een ader of indien gewenst volledige anaesthesie. Tijdens het onderzoek ligt u op de linker zij, en wordt de endoscoop ingebracht via de mond tot in de twaalfvingerige darm, het begin van de dundarm. Er wordt lucht ingeblazen om een goed zicht toe te laten. Vaak worden er biopsies genomen, met een tangetje dat doorheen de endoscoop wordt ingebracht.

Na het onderzoek :

Na het onderzoek kan de keel nog geïrriteerd zijn, en u kan een opgeblazen gevoel hebben door de lucht die tijdens het onderzoek werd ingeblazen. Een half uur tot een uur na het onderzoek is de keelverdooving uitgewerkt, en mag u drinken, en indien dit zonder problemen gaat mag u meestal eten. Het is mogelijk, afhankelijk van de bevindingen of behandeling uitgevoerd tijdens het onderzoek, dat uw arts u vraagt nadien nog een bepaalde tijd nuchter te blijven.

ALS U EEN KALMEERMIDDEL HEEFT GEKREGEN, MAG U DEZELFDE DAG GEEN VOERTUIG MEER BESTUREN OF GEVAARLIJKE ACTIVITEITEN UITVOEREN, OMDAT UW REFLEXEN EN BEOORDELINGSVERMOGEN VERMINDERD KUNNEN ZIJN.

Voorzorgen en risico's :

Een gastroscopie is een onderzoek met weinig risico op complicaties. Nochtans kan geen enkele arts het succes of de afwezigheid van risico's met betrekking tot het onderzoek garanderen. Er worden zoveel mogelijk voorzorgen genomen om de ongemakken en risico's minimaal te houden. Zo worden de toestellen en toebehoren grondig gedesinfecteerd of gesteriliseerd vóór gebruik. Een langer durende keelirritatie of pijn ter hoogte van de injectieplaats van het kalmeermiddel is mogelijk. Belangrijke complicaties zoals perforatie of ernstige bloeding zijn zeer zeldzaam.

Alternatief :

De gastroscopie is de beste methode om de slokdarm, de maag en het duodenum te onderzoeken. Een radiografie van de maag is mogelijk, na drinken van barium, maar geeft minder gedetailleerde informatie, en laat niet toe biopsies te nemen of een behandeling uit te voeren. Terugbetaling van geneesmiddelen is vaak gebaseerd op een endoscopieverslag, en niet toegestaan na enkel radiografie. Echografie of CT-scan kunnen een gastroscopie niet vervangen.

In geval van weigering :

Indien een gastroscopie die door een arts noodzakelijk wordt geacht, niet wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat een op dat moment behandelbare (medicamenteus, endoscopisch of chirurgisch) ziekte niet wordt ontdekt, met nefaste gevolgen. Het is ook mogelijk dat geen terugbetaling van medicatie kan verkregen worden.

UW HUISARTS STAAT TOT UW BESCHIKKING VOOR ALLE AANVULLENDE INFORMATIE OF DE ASSISTENT INWENDIGE ZIEKTEN MET WACHT VIA TEL.NR. 051/23.71.11.